

回覧												

垂水市農林技術協会だより

第3号：令和4年6月16日発行

発行・事務局：垂水市農林課
 問合せ先：32-1224（直通）

イヌマキの害虫「キオビエダシヤク」に注意

キオビエダシヤクは、イヌマキやナギの葉を食害する害虫です。
 その他樹木や人体に影響はありませんが、年に数回発生し、幼虫は木を丸坊主になるまで食害することもあり、場合によっては、木が枯死することもあります。

防除は、以下の方法を参考に、必要に応じて対策を行ってください。

- 1.少数発生の際は、木を揺すり、落下した幼虫を捕殺又は拾い集めて焼却
- 2.大発生の際は、下表の薬剤を使用する方法を守って散布

薬剤名	希釈倍数	使用液量 (10aあたり)	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	同じ有効成分 を含む農薬の 総使用回数
トレボン乳剤	4000倍	100~700 ℓ	幼虫発生期	6回以内	散布	6回以内
スプラサイド乳剤40	1500~ 2000倍	200~700 ℓ	発生初期	5回以内		5回以内
ロックオン	1000倍			2回以内		2回以内
アディオオン乳剤	4000~ 8000倍			6回以内		6回以内



◀ キオビエダシヤクの成虫（左写真）と幼虫（右写真）

○ご自身で薬剤散布等ができない場合は、下記事業者でも作業を受託しておりますので、お問い合わせください。

- 【事業者】 ●垂水市シルバー人材センター 0994-32-9781
 ●大隅森林組合垂水支所 0994-32-5019